


Nombre científico: <i>Daphnopsis racemosa</i>	Nombre común: Envira
Familia	Timelaceae
	<p><u>Localización en el Uruguay y la región:</u> Se encuentra frecuentemente en la zona este, Maldonado, y Rocha, generalmente asociada a Palmares.</p>
<p>Porte: Arbusto de 1 a 3 m de altura, de corteza muy tenaz; inerme.</p> <p>Hojas/Frutos: Hojas simples, alternas, espatuladas, oblanceoladas hasta obovadas, integra, verde amarillentas, glabras de ápice retuso, a veces acuminado y base cordada hasta auriculada, sésiles o subsésiles. Flores en laxos racimillos que nacen en las partes desnudas de ramas y ramillas, blancas, pequeñas y cortamente pecioladas. Especie dioica. Fruto drupa ovoide, glabra, de 3-6 mm de largo. Follaje persistente. Floración a fines de invierno; el fruto madura en noviembre y diciembre.</p> <p>Origen: Especie propia de Brasil, Paraguay, noreste de Argentina y Uruguay, donde es hallada en todo el territorio creciendo en montes serranos y ribereños y asociada a los palmares de <i>Butia capitata</i>. En muchos lugares es común verla fuera del monte, formando pequeños matorrales muy bajos, hecho que indica la anterior existencia de monte en tales lugares, que habría sido destruido por el talado y posterior pastoreo, ya que la especie en forma natural crece debajo de otros árboles de mayor porte como coronillas, arrayanes, arueras y molles.</p> <p>Usos: De la corteza se extraen fibras bastante resistentes; en nuestra campaña se emplea comúnmente para atar. Es decorativo, ocupa lugares sombreados en un jardín o parque, aportando tonalidades verdosas muy claras y oscuras, según la época del año.</p>	